

ИНСЕКТИЦИД

Скарабей®

дифлубензурон, 300 г/л
+ эсфенвалерат, 88 г/л

Ему все стадии
покорны



ИНСЕКТИЦИД

Скарабей®

Общая информация



ИНСЕКТИЦИД

Скарабей®

Общая характеристика

avgust crop protection

Двухкомпонентный инсектицид
для борьбы с чешуекрылыми
и саранчовыми вредителями



ИНСЕКТИЦИД

Скарабей®

Общая
характеристика

avgust 
crop protection

**дифлубензурон, 300 г/л
+ эсфенвалерат, 88 г/л**

Препаративная форма
суспензионная эмульсия

Культуры

яблоня, груша, айва, виноград, капуста
белокочанная и цветная, рапс, кукуруза,
подсолнечник, соя, участки, заселенные
саранчовыми

Спектр действия

чешуекрылые и саранчовые вредители

ИНСЕКТИЦИД

Скарабей®

Преимущества

avgust crop protection

- отличная эффективность против чешуекрылых, а также саранчовых вредителей
- гибель вредителей на всех стадиях их развития – от яиц до имаго
- два активных ингредиента из разных химических классов
- сохранение активности при высоких температурах и устойчивость к инсоляции
- отсутствие аналогов на рынке

ИНСЕКТИЦИД

Скарабей®

Спектр действия

avgust 
crop protection

В семечковых садах – яблонная
плодожорка, листовертки

На виноградниках – гроздевая
листовертка

На капусте – капустная моль,
капустная совка

На пастбищах – саранчовые

ИНСЕКТИЦИД

Скарабей®

Спектр действия

avgust 
crop protection

На рапсе – крестоцветные блошки, рапсовый цветоед, капустная моль

На кукурузе – хлопковая совка, стеблевой кукурузный мотылек, тли

На подсолнечнике – хлопковая совка, тли

На сое – луговой мотылек, акациевая огневка

Скарабей®

Механизм действия

Дифлубензурон обладает контактным и кишечным действием, нарушает процессы линьки у вредных насекомых. Не действует на имаго, но нарушает развитие яиц и личинок. Максимальный овицидный эффект наблюдается при откладке самками яиц на обработанные растения.

Эсфенвалерат обладает контактно-кишечным действием, воздействует на нервную систему насекомых. Проявляет также репеллентный эффект



ИНСЕКТИЦИД

Скарабей®

Скорость воздействия

**Начинает действовать через 30 мин
после обработки**



Скарабей®

Период защитного действия

**14 суток и более,
в зависимости от
погодных условий
и численности
вредителей**



Скарабей®

Регламенты применения

Культура	Вредитель	Норма расхода препарата, л/га
Яблоня, груша, айва	Яблонная плодожорка, листовертки	0,35 - 0,7
Виноград	Гроздевая листовертка	0,3 - 0,6
Капуста белокочанная и цветная	Капустная моль, капустная совка	0,2 - 0,4
Пастбища, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность	Саранчовые	0,2

Скарабей®

Регламенты применения

Культура	Вредитель	Норма расхода препарата, л/га
Рапс яровой и озимый	Крестоцветные блошки, рапсовый цветоед	0,1 - 0,2
	Капустная моль	0,2 - 0,4
Кукуруза	Хлопковая совка, стеблевой кукурузный мотылек	0,4 - 0,5
	Тли	0,2
Подсолнечник	Хлопковая совка	0,2 - 0,4
	Тли	0,2
Соя	Луговой мотылек, акациевая огневка	0,2 - 0,3

Скарабей®

Особенности применения

- за сезон разрешено проводить одно опрыскивание, в садах и на виноградниках - два
- срок ожидания в садах и на виноградниках – 28 дней, на капусте и полевых культурах – 21 день, при борьбе с саранчовыми – не регламентируется



Скарабей®

Особенности применения

- для предотвращения возникновения устойчивости вредителей рекомендуется чередовать применение препарата с инсектицидами из других химических классов
- при высокой численности чешуекрылых вредителей рекомендуется применять максимальные нормы расхода
- для повышения эффективности обработки следует добавить в рабочий раствор адъювант Полифем и при этом вносить не менее 200 л/га раствора



ИНСЕКТИЦИД

Скарабей®

Ограничения

avgust crop protection

Препарат высокоопасен для пчел (1-й класс опасности)

- погранично-защитная зона для пчел – не менее 4 - 5 км
- ограничение лёта пчел – не менее 4 - 6 суток или удаление семей пчел из зоны обработки на срок более 6 суток

Скарабей®

Расход рабочей жидкости

на полевых и овощных культурах и против саранчовых – **200 - 400** л/га, по всходам рапса – **100 - 200**, в садах – **600 - 1200**, на виноградниках – **500 - 1000** л/га



Скарабей®

Совместимость

Совместим с большинством пестицидов, за исключением препаратов, имеющих щелочную реакцию



ИНСЕКТИЦИД

Скарабей®

Испытания



ИНСЕКТИЦИД

Скарабей®

Полевой
производственный опыт

avgust 
crop protection

**ООО «Снежеток»
Тамбовской области**

Культура:
яблоня

Вредитель:
яблонная плодожорка,
гранатовая огневка

Применение:
Скарабей дробно; **Стиллет** +
ПАВ Полифем, 0,06 л/га

Скарабей®

Контроль без обработки



**Плод, поврежденный
яблонной плодожоркой
(кремовая гусеница)
и гранатовой огневкой
(розовая гусеница)**

ИНСЕКТИЦИД

Скарабей®

Результаты применения

avgust 
crop protection



**Плоды,
защищенные
Скарабеем
и Стилетом**

Скарабей®
Свидетельство
о регистрации



Для сельскохозяйственного производства:

Норма применения препарата, л/га	Культура	Вредный объект	Способ, время обработки, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)
1	2	3	4	5
0,35-0,7	Яблоня, груша, айва	Яблонная плодожорка, листовёртки	Опрыскивание в период вегетации. Концентрация – 0,07 %. Расход рабочей жидкости – 600-1200 л/га	28(2)
0,3-0,6	Виноград	Гроздевая листовёртка	Опрыскивание в период вегетации. Концентрация – 0,06 %. Расход рабочей жидкости – 500-1000 л/га	
0,2-0,4	Капуста белокочанная, капуста цветная	Капустная моль, капустная совка	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га	21(1)
0,2	Пастбища, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность	Саранчовые	Опрыскивание в период развития личинок. Срок для сбора дикорастущих грибов и ягод на обработанных территориях (пастбища и дикая растительность) – не ранее 30 дней. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га	-(1)

Для личных подсобных хозяйств:

Норма применения препарата	Культура	Вредный объект	Способ, время обработки, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)
1	2	3	4	5
3,5-7 мл/ 10 л воды	Яблоня, груша, айва	Яблонная плодожорка, листовёртки	Опрыскивание в период вегетации. Концентрация – 0,07 %. Расход рабочей жидкости – 1-5 л/дереву (в зависимости от возраста и объема кроны)	28(2)
3-6 мл/10 л воды	Виноград	Гроздевая листовёртка	Опрыскивание в период вегетации. Концентрация – 0,06%. Расход рабочей жидкости – 0,5-1 л/куст	
2-4 мл/3 л воды	Капуста белокочанная, капуста цветная	Капустная моль, капустная совка	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 3 л/ 100 м ²	21(1)

Срок безопасного выхода людей на обработанные препаратом площади для проведения ручных и механизированных работ – 3 дня.
Запрещается применение препарата: авиационным методом, в водоохранной зоне водных объектов.

Скарабей®

Свидетельство
о регистрации



Для сельскохозяйственного производства:

Норма применения препарата, л/га	Культура	Вредный объект	Способ, время обработки, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)
1	2	3	4	5
0,1-0,2	Рапс яровой и озимый	Крестоцветные блошки	Опрыскивание в период всходов. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га	21(1)
		Рапсовый цветоед	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га	
Капустная моль				
0,2-0,4	Кукуруза	Хлопковая совка, стеблевой кукурузный мотылек		
0,4-0,5		Тли		
0,2				
0,5		Подсолнечник	Хлопковая совка	
0,2	Подсолнечник	Тли		
0,2-0,3		Соя	Луговой мотылек, акациевая огневка	

Запрещается применение препарата: авиационным методом, в водоохранной зоне водных объектов.

Срок безопасного выхода людей на обработанные пестицидом площади для проведения механизированных работ – 3 дня.

Мобильные приложения



Каталог продукции
для России и Беларуси



Август Чекер.
Защита от контрафакта





С нами расти легче

avgust.com