

Инструкция по применению препарата Морестан

Механизм действия и свойства

Действующее вещество: Хинометионат является контактным фунгицидом и акарицидом, а также инсектицидом.

Механизм действия: Морестан обладает комплексным действием:

Инсектицидный эффект: борется с вредителями, особенно эффективен против белокрылки.

Акарицидные свойства: проявляются при борьбе с различными видами растительноядных клещей (паутинный, томатный ржавый, цитрусовый ржавый клещ), уничтожает вредителей, их яйца и личинки.

Фунгицидный эффект: применяется для профилактики и лечения мучнистой росы, ржавчины и других заболеваний растений.

Формуляция: Средство представляет собой желтый порошок размером менее 63 мкм, что обеспечивает хорошее распределение при опрыскивании.

Скорость воздействия: Информация о точной скорости воздействия не указана, однако препарат проявляет высокую эффективность при борьбе с вредителями и заболеваниями.

Период защитного действия: Рекомендуется применять в ротации с другими аналогичными препаратами для обеспечения непрерывной защиты.

Спектр действия

Контролируемые культуры и вредные объекты

Основные культуры: Огурец, помидор, арбуз, дыня, тыква, зеленый перец, баклажан, перилла, клубника, мандарин, вишня, шелковица, цветы и декоративные растения, деревья, яблоня, груша, инжир.

Вредные объекты: Белокрылка, паутинный клещ, томатный ржавый клещ, цитрусовый ржавый клещ.

Заболевания: Мучнистая роса, ржавчина и другие заболевания растений.

Способы применения и рекомендации

Порядок приготовления рабочей жидкости

Морестан представляет собой желтый порошок. Рабочую жидкость готовят путем разбавления порошка в воде.

Рекомендации по применению

Рекомендуется применять на плодовых культурах до дня сбора в ротации с другими аналогичными препаратами, то есть поочередно.

Срок ожидания (использования в пищу после обработки)

- На овощах и фруктах (баклажанах, огурцах, томатах, перце, яблоке, инжир, груша) – за день до сбора урожая
- На дыне, арбузе – 3 дня

Нормы расхода

Культура / Цель	Вредный объект / заболевание	Норма применения препарата	Норма расхода рабочей жидкости	Способ, время, особенности применения	Срок ожидания, дни	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Овощные, плодовые, декоративные (профилактика)	Мучнистая роса, ржавчина, клещи	0,5 г / 1,5 л воды	1,5 л / на 1 л воды	Опрыскивание в период вегетации. Рекомендуется ротация с другими препаратами.	1-3 (зависит от культуры)	Не регламентируются
Овощные, плодовые, декоративные (лечение болезней)	Мучнистая роса, ржавчина	0,5 г / 1 л воды	1 л / на 1 л воды	Опрыскивание в период вегетации при первых признаках заболевания.	1-3 (зависит от культуры)	Не регламентируются
Овощные, плодовые, декоративные (от вредителей)	Белокрылка, паутинный клещ, ржавые клещи	1 г / 1 л воды	1 л / на 1 л воды	Опрыскивание в период вегетации при обнаружении вредителей.	1-3 (зависит от культуры)	Не регламентируются

Важная информация о безопасности и хранении

⚠ Безопасность

Морестан является малотоксичным для человека и животных, не имеет запаха. Средство представляет собой желтый порошок размером менее 63 мкм.

Внимание: Применяйте меры предосторожности и индивидуальной защиты, как при обычном использовании инсектицидов.

Условия транспортирования и хранения

- Гарантийный срок хранения: 4 года
- Хранить в типовом складском помещении вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла
- Транспортирование препарата осуществляется всеми видами транспортных средств в соответствии с правилами перевозки опасных грузов, действующими на данном виде транспорта